

ANTALGIQUES DU PALIER I (ANALGÉSIIQUES NON MORPHINIQUES)

	Produits	Pic d'action	Intervalle d'administration	Posologie maximale / j	Précautions d'emploi	Surveillance en " aigu "
PARACÉTAMOL	<i>Dafalgan</i> ® cp à 1 g	30 à 60'	6 à 8 heures	3 à 4 g	Insuffisance hépatocellulaire sévère	Hypersensibilité (rash cutané, érythème, œdème de Quincke, urticaire, choc anaphylactique)
	<i>Dafalgan</i> ® gel à 500 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	3 à 4 g		
	<i>Dafalgan</i> ® suppo à 600 mg	2 à 3 heures	6 à 8 heures	2400 mg		
	<i>Doliprane</i> ® à 1 g (cp, cp eff., gel, suppo, pdre sol. buv)	30 à 60'	6 à 8 heures	3 à 4 g		
	<i>Dolipraneoro</i> ® cp orodisp. à 500 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	3 à 4 g		
	<i>Dolko</i> ® cp à 1 g	30 à 60'	6 à 8 heures	3 à 4 g		
	<i>Dolko</i> ® cp, sol. buv à 500 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	3 à 4 g		
	<i>Efferalgan</i> ® cp eff. à 500 mg, 1 g	30 à 60'	6 à 8 heures	3 à 4 g		
	<i>Doliprane</i> ®, <i>Algodol</i> ® cp à 500 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	3 à 4 g		
	<i>Perfalgan</i> ® 10 mg/ml sol pour perf (flacon de 100 ml)	15'	6 à 8 heures	3 g		
A.I.N.S	<i>Voltarène</i> ® cp à 25 et 50 mg	2 heures	8 à 12 heures	50 à 100 mg	Insuffisance rénale, prescription simultanée d'antiagrégant plaquettaire, d'hyperkaliémiant, d'anticoagulant	Douleurs abdominales, hémorragie digestive, insuffisance rénale aiguë, anite, rectite, anomalies des enzymes hépatiques
	<i>Voltarène LP</i> ® cp à 75 et 100 mg	4 heures	12 heures	150 à 200 mg		
	<i>Voltarène</i> ® suppo à 100 mg	1 heure	12 à 24 heures	100 à 200 mg		
	<i>Voltarène</i> ® sol inj IM à 75 mg	20'	24 heures	75 mg		
	<i>Profénid</i> ® cp à 100 mg	60 à 90'	8 à 24 heures	300 mg		
	<i>Profénid</i> ® gel. à 50 mg	60 à 90'	8 à 24 heures	150 mg		
	<i>Profénid LP</i> ® cp à 200 mg	3 heures	24 heures	200 mg		
	<i>Profénid LP</i> ® gel à 200 mg	6 heures	24 heures	200 mg		
	<i>Profénid</i> ® suppo à 100 mg	45 à 60'	8 à 24 heures	100 à 300 mg		
	<i>Advil</i> ®, <i>Nurofen</i> ®, <i>Ibuprofen</i> ®, <i>Antarène</i> ® cps à 200 et 400 mg	90'	6 à 8 heures	1200 mg		
	<i>Apranax</i> ® cps à 750 mg, 550 mg, 275 mg granulés à 250 mg et 500 mg	1 heure	12 à 24 heures	1500 mg		
	<i>Indocid</i> ® gel à 25 mg	2 heures	12 à 24 heures	200 mg		
	<i>Indocid</i> ® suppo à 50 et 100 mg	2 heures	12 à 24 heures	200 mg		
	<i>Chrono-Indocid</i> ® gel à 75 mg	2 heures	12 à 24 heures	200 mg		
	<i>Acupan</i> ® IV ou IM à 20 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	120 mg	Insuffisance hépatique ou rénale	Tachycardie, rétention d'urine, hallucinations, confusion, vertiges

