

ANTALGIQUES DU PALIER II (MORPHINIQUES FAIBLES)

Produits	Pic d'action	Intervalle d'administration	Posologie maximale / j	Précautions d'emploi	Surveillance en " aigu "
PARACÉTAMOL-CODÉINE					
<i>Dafalgan codéine</i> ® cp à 500/30 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	6 cps		Constipation, nausées, douleurs abdominales, vertiges, hypersensibilité
<i>Lindilane</i> ® cp à 400/25 mg	30 à 60'	4 à 6 heures	6 cps		
<i>Efferalgan codéine</i> ® cp eff. à 500/30 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	6 cps		
<i>Codoliprane</i> ® cp à 400/20 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	6 cps		
<i>Algisedal</i> ® cp à 400/25 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	6 cps		
<i>Klipal</i> ® cp à 300/25 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	12 cps		
<i>Klipal</i> ® cp à 600/50 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	6 cps		
DIHYDROCODÉINE					
<i>Dicodin LP</i> ® cp à 60 mg	2 heures	12 heures	2 cps	Insuffisance respi, rénale, hépatique	Idem
PARACÉTAMOL-EXTRAIT D'OPIUM-CAFÉINE					
<i>Lamaline</i> ® gel à 300/10/30 mg	30 à 60'	4 à 6 heures	10 gel	Insuffisance hépatocellulaire	Insomnie, constipation
<i>Lamaline</i> ® suppo à 500/15/50 mg	2 hres 30	8 à 12 heures	6 suppo		
PARACÉTAMOL-CAFÉINE					
<i>Claradol caféine</i> ® cp à 500/50 mg	30 à 60'	4 à 6 heures	6 cps	Insuffisance rénale	Insomnie, palpitations
<i>Claradol caféine</i> ® cp eff. à 500/50 mg	30 à 60'	4 à 6 heures	6 cps		
ASPIRINE-CODÉINE-CAFÉINE					
<i>Sedaspir</i> ® cp à 500/50/20 mg	1 à 2 hres	4 à 6 heures	6 cps		
TRAMADOL					
<i>Topalgic</i> ® gel à 50 mg	2 heures	4 à 6 heures	8 gel	Épilepsie non contrôlée	Nausées, vomissements, tachycardie, céphalées, somnolence, convulsion, confusion, cauchemars
<i>Topalgic</i> ® sol. injectable à 100 mg/ml	1 heure	4 à 6 heures	600 mg		
<i>Contramal LP</i> ® cp à 100, 150, 200 mg	5 heures	6 à 8 heures	6 cps		
<i>Zamudol LP</i> ® cp à 50, 100, 150, 200 mg	5 heures	6 à 8 heures	6 cps		
<i>Zamudol</i> ® sol. injectable à 100 mg/2 ml	1 heure	4 à 6 heures	600 mg		
<i>Zumalgic</i> ® cp eff. à 50, 100 mg	1 heure	4 à 6 heures	400 mg		
TRAMADOL-PARACÉTAMOL					
<i>Ixprim</i> ®, <i>Zaldiar</i> cp à 37,5/325 mg	1 heure	6 à 8 heures	8 gel	Insuffisance hépatocellulaire	Idem
<i>Ixprim</i> ®, <i>Zaldiar</i> cp eff. à 37,5/325 mg	30 à 60'	6 à 8 heures	8 cps		